



什么是猫白血病和猫艾滋病？

猫白血病（FeLV）和猫免疫缺陷病（猫艾滋病FIV）都是由逆转录病毒引起的，与人类的艾滋病病毒类似，但并不一样。目前，没有迹象表明猫能将这种疾病传染给人或者从人类这里感染。这些病毒具有种属特异性。但是，它们可以传染其他猫。这两种病毒会抑制免疫系统的启动，从而继发感染和疾病。最常见的传染性的感染发生于上呼吸道。最常见的非传染性疾病是癌症。一个猫可以同时受猫白血病和猫艾滋病侵害。

（应该知道所有猫的猫白血病和猫艾滋病的感染状况——美国从事猫行业者协会，2005）

北京新天地国际动物医院连同美国从事猫行业者协会强烈建议您给您的爱猫做猫白血病和猫艾滋病测试。如果发现的早并且适当的治疗可以使受感染的猫生存更长的时间。

为什么要给您的爱猫做猫白血病和猫艾滋病测试？

感染的早期发现将不仅帮助您维持猫咪的健康，而且也会防止传染给其他猫咪。幸运的是，猫白血病和猫艾滋病的诊断非常容易。只需要很少量的血液，新天地国际动物医院的宠物医生可以在医院的化验室完成所有的测试。您只需要等上几分钟就可以得到结果，这可以使您从宠物医生那里获得及时的咨询。

什么时候测试？猫白血病和艾滋病测试在以下情况下非常重要：

- 如果您的猫从来没有做过此类测试
- 如果您的猫生病了，即便之前的测试结果是阴性的
- 当猫咪刚刚被收养时，无论家中是否还有其他的猫
- 如果您的猫最近和患病猫接触（例如：如果被其他不了解背景的猫咬到或者您的猫咪出走并与其他流浪猫在一起，都有可能造成病毒的感染）。宠物医生建议您，只要您的猫咪有和患病猫接触的可能性就需要定期给猫做猫白血病和艾滋病测试
- 提前注射猫白血病和艾滋病疫苗
- 如果您的猫在室内生活，而且不清楚猫白血病和艾滋病的状况；患病猫可以数年不表现症状，在这期间，它们可以传染其他猫

与ICVS的宠物医生交流可以了解更多关于猫白血病和猫艾滋病的风险，早期的诊断是让猫咪生活的更加健康和长久的关键。

本栏目文字内容归新天地国际动物医院公司所有，任何单位及个人未经许可，不得擅自转载使用